

Poučení před konizací

Vážená paní, Na základě provedených vyšetření Vám byly diagnostikovány přednádorové změny děložního čípku, a proto je nutné provést ošetření, které se nazývá **konizace**.

Následující poučení shrnuje princip tohoto ošetření, nutná režimová opatření po výkonu a nejčastější komplikace.

Výkon se provádí v lokální anestezii, to znamená aplikací znecitlivující látky přímo do děložního čípku. Poté již pacientka necítí žádné bolestivé podněty, vnímá pouze tlak gynekologického zrcadla v pochvě, tak jako při běžném gynekologickém vyšetření. Po znecitlivění děložního čípku z něj lékař vyřízne malý konus na špičce s cílem odstranit všechny přednádorové změny a tím zabránit do budoucna vzniku zhoubného nádoru. Následně se provede i odběr vzorku sliznice z kanálku ošetřeného děložního čípku a vše se posílá na histologické vyšetření, které posoudí stupeň přednádorových změn a zejména to, zda při standardním rozsahu ošetření byly změny odstraněny všechny. Výsledky histologie budou písemně zaslány Vašemu gynekologovi. V rámci co nejvyšší kvality ošetření zasiláme vzorky do Biopstické laboratoře Plzeň, která patří k nejlepším pracovištím v České republice. Výsledek histologie bude dostupný cca do 14 dnů od odeslání vzorků. Konizace se provádí těsně po skončení menstruačního krvácení a to zejména z důvodů lepšího hojení a omezení krevních ztrát. Pokud žena nemenstruuje (menopauza, hormonální terapie...), domluví termín ošetření individuálně s lékařem.

Konizace

Samotný výkon se provádí nejmodernější metodou, kdy při vytínání konusu z děložního čípku dochází zároveň k tepelnému ošetření zbylé tkáně a zástavě krvácení. V rámci hojení dochází ke slabému krvácení z ranné plochy, které trvá cca 4-5 týdnů, tj. po celou dobu 1. fáze hojení. Pokud krvácení dosahuje velmi silné intenzity (např. jako při nejsilnější fázi menses), je třeba vyhledat lékařskou kontrolu. V takovém případě se většinou do pochvy zavede na cca 24 hodin obvazová tamponáda, která krvácení zastaví. První 2 týdny po konizaci je nutné zcela vyloučit fyzickou námahu následně po celou dobu špinění a krvácení je vyloučen pohlavní styk a koupání - sprchování je samozřejmě dovoleno. Definitivní zahojení lze očekávat za cca 3 měsíce, kdy tkáň čípku získá zpět svou původní pevnost. Do té doby by eventuelní gravidita byla pro váš čípek velmi zatěžující s vysokým rizikem potratu či předčasného porodu, tudíž je velmi vhodné u žen ve fertilním (plodném) věku užívání hormonální antikoncepce minimálně 3 měsíce po konizaci. Po této době by již gravidita měla být bez rizika, i když se v poslední době objevily informace z některých vědeckých studií a mírně zvýšeném riziku předčasného porodu po proběhlé konizaci. Toto riziko by však mělo být zvýšeno jen zcela nepatrně a zřejmě souvisí s nesprávně technicky provedeným výkonem méně zkušenými lékaři. Proběhlá konizace se neprojeví na Vašem menstruačním cyklu, na Vašem sexuálním životě a ani na možnosti dalšího otěhotnění.

Toto poučení nemůže zdaleka obsáhnout celou problematiku konizací, proto se prosím ptejte před samotným výkonem na Vše, co Vás zajímá. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše proto, aby Váš výkon proběhl bez komplikací.

Uvedeným podpisem stvrzuji, že jsem byla plně seznámena s důvodem výkonu, způsobem jeho provedení a všemi možnými komplikacemi. S výkonem souhlasím, poučení rozumím.

Prohlašuji, že jsem před výkonem lékaře plně informovala o svém zdravotním stavu, o všech alergiích, nejsem gravidní a nemám kardiostimulátor.

V Ostravě dne podpis pacientky

Prosím, vyplňte či proškrtněte níže uvedené údaje a sdělte je lékaři před výkonem

Příjmení, jméno, ročník narození:

.....

Telefonní kontakt:

.....

Onemocnění, na které se léčíte:

.....

.....

Mám alergii na:

.....

.....

Užívám tyto léky:

.....

.....

Váš registrující gynekolog:

.....